



接種回数		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目	13回目	14回目	15回目
理想的な接種回数		生後2か月	生後3か月 2回目接種の 4週間後	生後4か月 2回目接種の 4週間後	生後5か月 3回目接種の4 週間後	生後9か 月	1歳の 誕生日以降 (1 - 2歳未満)	6回目の 4週間後	7回目の 6か月後	3歳~	9回目の 1~4 週間後	10回目の 1年後	年長 (5,6歳) 就学前1 年間	小学校4年 (9歳)か ら13歳前日 まで	小学校6年生 (11歳)か ら13歳前日 まで	小学校6年 から高校1年 生まで
種類	回数															
ヒブ	4回	●	●	●				●								
肺炎球菌	4回	●	●	●			●									
B型肝炎	3回	●	●			●★										
4種混合	4回	●	●	●					●							
ロタウイルス 生後6週0日から生後	3回	●*	●	●												
BCG	1回				●											
麻しん風しん (MR)	2回						●						●			
おたくふくかぜ	2回						※	※					※			
水痘(みずぼうそ う)	2回							●	●							
日本脳炎	4回									●	●	●		●		
2種混合(DT)	1回														●	
子宮頸がん	2-3回															●

\* ロタウイルス1回目は1回目は生後6週0日~14週6日までです(詳しくは当院スタッフまでお気軽にお問い合わせください。)

★は9か月健診と同時に行います。(神戸のみ 明石市は実施できません)

※はご希望があれば接種いたします。(基本的には自費6700円となりますが、自治体からの補助がある場合があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい)

●子宮頸がんワクチン：シルガード9で2回接種の方(2023年4月以降初回で15歳未満)は2回目は1回目接種から6か月後になります。